

Posiadacz zezwolenia:

SBM Développement SAS, 60 chemin des Mouilles, 69130 Ecully, Republika Francuska

Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

SBM Life Science Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa, tel.: +48 22 635 46 44

Podmiot odpowiedzialny za końcowe pakowanie i etykietowanie środka ochrony roślin:.....

## SANIUM PIN

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych

Zawartość substancji czynnej:

flupyradifuron (związek z grupy butenolidów)– 18,8 g/kg (1,88 %)

Zawartość składników nawozowych:

azot ogólny – 7,4 %,

fosfor – 3,55 %,


potas – 5,7 %,

żelazo ogólne – 0,33 %,

magnez – 1,4 %,

siarka – 3,15 %.

**Zezwolenie MRiRW nr 171/2018 z dnia 15.11.2018 r.  
ostatnio zmienione decyzją MRiRW nr R-392/2023d z dnia 19.05.2023 r.**

	
H411	Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
EUH401	W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia.
	Zebrać rozsypany produkt.

Chronić przed spożyciem przez zwierzęta domowe.

### OPIS DZIAŁANIA

INSEKTYCYD o działaniu żołądkowym w formie pałeczek (PR), które zawierają także nawóz.

Środek jest pobierany przez korzenie i transportowany w wyższe partie rośliny.

Zgodnie z klasyfikacją IRAC substancja czynna środka - flupyradifuron należy do grupy 4D.

### STOSOWANIE ŚRODKA

Środek do stosowania wyłącznie do podłoża w doniczkach i pojemnikach (skrzynkach) przeznaczonych do amatorskiej uprawy roślin ozdobnych.

## **Rośliny ozdobne**

### **-rośliny doniczkowe uprawiane w pomieszczeniach**

*Mszyca różano-szczeciowa, mszyca brzoskwiniowo-ziemniaczana, mączlik szklarniowy, czerwce (w tym: miseczniki np. misecznik szklarniowy i misecznik cytrusowiec, tarczники np. tarcznik trzmielinowy)*

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 pałeczki / 1 l podłoża.

### **-rośliny doniczkowe uprawiane na zewnątrz (balkony, tarasy)**

*mszyca brzoskwiniowo-ziemniaczana, mszyca trzmielinowo-burakowa, mszyca ogórkowa i inne gatunki mszyc*

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 pałeczki / 1 l podłoża.

W przypadku zastosowania na roślinach uprawianych w pojemnikach czy skrzynkach 0,5 pałeczki środka powinno przypadać na co najmniej 10 cm długości pojemnika (skrzynki).

Termin stosowania środka: środek zastosować po wystąpieniu pierwszych objawów obecności szkodników.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

### Uwaga

Pałeczki umieścić w pobliżu korzeni rośliny wciskając ją w glebę tak, aby była całkowicie przykryta. Po umieszczeniu obficie podlać roślinę wodą.

Po zastosowaniu pałeczek pierwsze efekty widoczne są przeważnie: w przypadku zwalczania mszyc i czerwców po 7 dniach, mączlika szklarniowego po 14 dniach. Środek działa zapobiegawczo przeciw mszycom do 9 tygodni.

## **ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, OKRESY KARENCJI I SZCZEGÓLNE WARUNKI STOSOWANIA**

Substancją czynną środka jest flupyradifuron - związek z grupy butenolidów, modulator receptora nikotyno-acetylocholinowego (nAChRs), zaklasyfikowany wg IRAC do grupy 4D. W przypadku stwierdzenia niewystarczającej skuteczności działania nie stosować środków zawierających substancje czynne należące do tej samej grupy chemicznej, o tym samym mechanizmie działania.

## **ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DLA OSÓB STOSUJĄCYCH ŚRODEK, PRACOWNIKÓW ORAZ OSÓB POSTRONNYCH**

Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.

Stosować rękawice ochronne (nitrylowe).

## **ŚRODKI OSTROŻNOŚCI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NATURALNEGO**

Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

Unikać niezgodnego z przeznaczeniem uwalniania do środowiska.

**W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających nie stosować w podłożu donic ustawionych na zewnątrz (balkony, tarasy), w których rosną rośliny mogące stanowić dla nich pożytek.**

## **WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN I OPAKOWANIA**

Chronić przed dziećmi.

Środek ochrony roślin przechowywać:

- w oryginalnych opakowaniach,

- w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą, skażenie środowiska oraz dostęp osób trzecich,
- w temperaturze 0°C - 30°C.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów. Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnianego do odbierania odpadów niebezpiecznych.

Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących środkami niebezpiecznymi.

## **PIERWSZA POMOC**

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.

W przypadku połknięcia: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z lekarzem.

Okres ważności - 2 lata

Data produkcji - .....

Zawartość netto - .....

Nr partii - .....